

## PROJET COVID-19 BELGIUM

### MESURES IPC POUR LE PILIER 2 : Nettoyage des chambres des résidents avec une suspicion d'infection à Covid-19.

Ces recommandations sont élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de rédaction de ce document. Les recommandations peuvent évoluer en fonction des nouvelles connaissances et du contexte épidémiologique et logistique.

Le but de ce protocole est de décrire le nettoyage des chambres avec résidents suspects/confirmés covid-19 dans le contexte des maisons de repos. Ce protocole de nettoyage peut être adapté pour le nettoyage du local de stockage de linge, de la zone de lavage, de la zone de stockage des déchets.

Si possible avoir du matériel de nettoyage spécifiquement pour les chambres suspects/confirmés, sinon prévoir dans la planification du nettoyage les chambres suspects/confirmés en dernier lieu.

#### **Avant de rentrer dans la chambre :**

#### **Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique**

Préparer le chariot avec le matériel de nettoyage et de désinfection :

Séparer le matériel propre (au-dessus) et sale (en bas) sur le chariot.

- 1 seau : eau + détergent
- 1 seau eau claire
- 1 seau : solution chlorée 1000 ppm
- 1 serpillère
- 1 petit seau solution chlorée 1000 ppm
- 2-3 chiffons propres par chambres
- 1 seau pour collecter les chiffons sales (en bas du chariot)
- Solution hydroalcoolique

Si possible : seau avec codes couleurs selon : (1) eau-savon ; (2) eau claire (3) solution chlorée

Matériel de protection personnel :

- Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique
- Retirer tous ses effets personnels (montre, stylo, téléphone)
- Mettre le vêtement de travail
- Mettre la charlotte
- Mettre les bottes ou sabots de travail
- Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique
- Mettre la blouse (ou le tablier)
- Mettre la protection oculaire/lunettes de protection ou écran facial

- Mettre le masque chirurgical
- Mettre les gants (jetable ou en caoutchouc)

Positionner le chariot d'entretien devant la porte de la chambre, une poubelle se trouve à la porte (dedans) pour disposer la blouse et les gants à la sortie. Une autre poubelle pour le masque et une bassine pour les lunettes sont à disposition à la sortie de la chambre.

### **Aération de la chambre**

Passer dans les chambres 15 minutes avant de commencer le nettoyage pour ouvrir au maximum toutes les fenêtres et les rideaux pour aérer et changer l'air de la pièce au maximum. Laisser les fenêtres ouvertes pendant tout le nettoyage. Attention à la sécurité du résident.

Si c'est possible, déplacer le résident dans une autre salle (isolée des résidents non suspects) pour éviter l'odeur du chlore et le froid (dû à l'aération de la chambre). Sinon placer le résident avec un masque chirurgical à son aise sur un siège de côté et lui proposer une veste.

### **Essuyage humide des surfaces fréquemment touchées de la chambre :**

Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d'être contaminées.

L'essuyage se fait avec un chiffon trempé dans la solution chlorée 0,1% et bien essoré, passer le chiffon sur les surfaces fréquemment touchées : poignées de porte, interrupteurs d'éclairage, table, tablette de nuit, cornet de téléphone, poignées de toilettes, barrière de lit, comptoirs, rampes. Changer de chiffon entre les différentes zones de la chambre, et entre les différentes pièces de la chambre (par exemple salle de bain). Disposer les chiffons sales dans le seau prévu à cet effet sur le chariot.

### **Nettoyage et désinfection du sol:**

Le sol doit être nettoyé avant d'être désinfecté (surtout s'il est sale en apparence). Nettoyage avec un détergent disponible sur le marché local, rincer (changer l'eau savonneuse et l'eau de rinçage dès qu'elles sont saturées) puis désinfecter avec une solution chlorée 1000 ppm (0,1%). Ne jamais mélanger le détergent et la solution chlorée. Après l'application de solution chlorée, ne pas rincer (sauf les surfaces en inox qui doivent être impérativement rincées), attendre le séchage complet.

### **Fermer les fenêtres, et essuyer les poignées avec la solution 0,1%.**

Si la météo le permet, toujours mieux de ventiler les chambres le plus possible, même en dehors des périodes de nettoyage.

### **Retirer l'équipement de protection individuel : (selon le protocole)**

La blouse et les gants s'enlèvent et se jettent DANS la chambre (poubelle à la sortie)

### **Solution hydroalcoolique**

Sortir de la chambre et enlever les lunettes, disposer les lunettes dans un seau pour la désinfection

### **Solution hydroalcoolique**

Enlever le masque

### **Solution hydroalcoolique**

Refermer la porte.

Spray solution 0,1% sous les bottes ou sabots de travail

## **Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique**

### **Désinfection du matériel utilisé :**

Avant de commencer la désinfection du matériel : Mettre des gants jetables, préparer une bassine avec une solution 0,1%, un petit seau de 0,1% pour l'essuyage et un seau d'eau claire.

- Les gants en caoutchouc, les lunettes doivent être désinfectés par trempage dans une solution de chlore à 0,1% pendant 5 minutes ; rincer ensuite à l'eau claire et laisser sécher.
- La partie immergeable de la serpillère doit être désinfectée par trempage dans une solution de chlore à 0,1% pendant 5 minutes ; rincer ensuite à l'eau claire et laisser sécher.
- Les parties du chariot souvent touchées, les manches de serpillères et les poignées de seaux doivent être essuyés avec un chiffon trempé dans la solution chlorée 0,1% et bien essoré.
- Les chiffons doivent être désinfectés par trempage dans une solution de chlore à 0,1% pendant 5 minutes ; rincez ensuite à l'eau claire et laissez sécher OU en machine à une température de minimum 60°C.
- Les bottes et les sabots doivent être nettoyés chaque jour au centre de santé avec de l'eau et du savon et désinfecté par trempage dans une solution de chlore à 0,1% pendant 5 minutes ; rincez ensuite à l'eau claire et laissez sécher.

## **Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique**